

5 Verwendung hyperpolymerer Hämoglobine zur Behandlung eines
Lungenödems

Beschreibung

Gegenstand vorliegender Erfindung

Die vorliegende Erfindung betrifft die Verwendung hypo-onkotischer, wässriger
10 Lösungen molekular-disperser chemisch modifizierter, hoch-molekular vernetzter
Hämoglobine, sogenannter Hämoglobin-Hyperpolymere, zur Herstellung von
Mitteln, zur symptomatischen, primär lebensrettenden Behandlung akuter Lun-
genödeme. Die Verabreichung erfolgt insbesondere intravasal. Überraschender
Weise kann eine additive Verabreichung vorgenommen werden, da
15 erfindungsgemäß der kolloid-osmotische (= onkotische) Druck des Blutes nur
wenig erhöht und das Blutvolumen deshalb kaum vergrößert wird. Die
erfindungsgemäße Anwendung bzw. Verabreichung ist somit (fast) Volumen-
neutral bezogen auf das Blut, in das die Injizierung vorgenommen wird. Somit
wird erstmals ein hyperpolymeres Hämoglobin-Derivat therapeutisch als Blut-
20 Additiv zur Behandlung eines Lungenödems eingesetzt.

Hintergrund der Erfindung

1. Künstliche Sauerstoffträger

Künstliche Sauerstoffträger / -transporter sind eine äußerst heterogene Gruppe
25 von Stoffen. Ihre namensgebenden Charakteristika sind ihre Fähigkeit,
Sauerstoff in Form des molekularen Disauerstoffes (O_2) reversibel zu binden
oder in sich zu lösen – damit haben sie eine prinzipielle Eigenschaft mit dem
natürlichen Sauerstoffträger / -transporter im Blut, dem Hämoglobin (Roter
Blutfarbstoff), das in den Erythrozyten (Roten Blutzellen) vorkommt, gemein –
30 sowie ihr potentielle Verwendbarkeit als intravasal (i. d. R. also intravenös) zu
applizierende Pharmazeutika oder in sonstigen biomedizinischen Anwendun-
gen.

(Eine umfassende Übersicht (Stand der Technik) in: RIESS J. G.: „Oxygen Carriers (‘‘Blood Substitutes’’) - Raison d’Etre, Chemistry, and Some Physiology’’, Chemical Reviews 101 (2001): 2797 - 2919; eine Übersicht zu vielen Hämoglobin-Derivaten in: VANDEGRIFF K. D.: „Haemoglobin-based Oxygen Carriers’’, Expert Opinions on Investigational Drugs 9 (2000): 1967 - 1984)

Die bekannten Sauerstoffträger unterscheiden sich sowohl hinsichtlich ihrer Beschaffenheit als auch der dadurch bedingten physikochemischen Eigenschaften und ihrer Verwendbarkeit.

So sind Perfluorocarbone mit und in wässrigen Lösungen, wie bspw. dem Blutplasma, nicht mischbar bzw. darin nicht lösbar. Sie können aber in Form fein disperser (mittels Emulgatoren stabilisierter) Tröpfchen darin emulgiert werden. Ebenfalls emulgiert oder suspendiert werden mit natürlichen oder künstlichen Sauerstoffträgern gefüllte Liposomen. Hierbei handelt es sich um mit einer Phospholipid-Doppelschicht-Membran umgebene Vesikel (künstliche Zellen oder auch künstliche Erythrozyten).

Frei in der wässrigen Phase (bspw. im Plasma) gelöst werden können Hämoglobine, ihre durch chemische Modifikation erhältlichen Derivate, sowie isolierte und notwendigerweise chemisch modifizierte Häm-Gruppen.

Der molekulare strukturelle Aufbau künstlicher Sauerstoffträger bedingt deren Art der Verabreichung , insbesondere, ob sie als ein Ersatz fehlendes Blut substituieren können, oder ob sie in vorhandenes Blut als Zusatz addiert werden können. Bisher beschriebene Produkte haben einen Sauerstofftransportierenden Plasmaersatz zum Ziel, also eine Plasmaersatz-Flüssigkeit zum Auffüllen des durch eine akute Blutung oder Blutentnahme teil-entleerten Blutgefäßsystems, die gegenüber den bekannten (nicht Sauerstofftransportierenden) Plasmaersatzmitteln darüber hinaus auch eine weitere wesentliche Funktion des Blutes, nämlich die des Sauerstofftransports, restituiert.

Perfluorocarbone und Liposomen lösen sich nicht im wässrigen Blutplasma, sie besitzen und erfüllen als deutlich getrennte, eigene, emulgierte oder suspendierte Phase ein gewisses Volumen, und erscheinen deshalb zum genannten Zweck als Sauerstoff-transportierender Plasmaersatzmittel prinzipiell

geeignet, nicht dagegen als ein Zusatz in das Blut, da sie dessen Volumen zwangsläufig vergrößern.

Um als Ersatz fehlenden Blutes geeignet zu sein, müssen Sauerstoff-transportierende Plasmaersatzmittel aus frei in einer wässrigen Phase gelösten

5 Hämoglobinen, oder ihren durch chemische Modifikationen erhaltenen Derivaten, sowohl in etwa isoton (die Tonizität ist ein relatives Maß für den osmotischen Druck) als auch isonkotisch (= iso-onkotisch, die Onkosie ist ein Maß für den onkotischen (= kolloid-osmotischen) Druck) mit dem Blutplasma sein. Zur Erzielung einer Isotonie befinden sich solche künstlichen Sauerstoffträger i. d. R. gelöst in einer Elektrolytlösung, die dem Blutplasma-Elektrolyten ähnelt.

10 Iso-Onkosie in pharmazeutischen Zubereitungen bisher entwickelter (und publizierter) Hämoglobin-Derivate als künstliche Sauerstoffträger bedingen diese selbst. Ihr molekulares Design entspricht der klinischen Anforderung nach einer Isonkosie, die durch eine hinreichende Anzahl onkotisch wirksamer Wirkstoffmoleküle realisiert wird.

15 Daher werden derartige, frei gelöste Hämoglobinderivate auch ganz besonders zur Anwendung bei (stärkeren) Blutverlusten vorgeschlagen. Für medizinische Indikationen ohne einen Blutverlust sind sie nur sehr bedingt (nämlich von der Menge/Dosis her äußerst begrenzt) einsetzbar, da sie aufgrund ihrer genannten Eigenschaften das Blutvolumen zwingend um das Volumen ihrer injizierten oder
20 infundierten pharmazeutischen Zubereitung vergrößern.

2. Hämoglobin-Hyperpolymere

Sollen künstliche Sauerstoffträger zur Behandlung eines Sauerstoffmangels als
25 Additive eingesetzt werden, so sollten diese einen ausreichend geringen kolloid osmotischen Druck aufweisen (vgl. Barnikol W. K. R., et al. (1996): „Hyperpolymere Hämoglobine als künstliche Sauerstoffträger - Ein innovativer Ansatz der medizinischen Entwicklung“, Therapiewoche 46: 811 - 815). Sie sind konzipiert, um als künstliche Sauerstoffträger die Sauerstoff-Transportkapazität
30 vorhandenen Blutes zu erhöhen, wenn kein Blutverlust zu ersetzen ist. Damit Hämoglobin-Hyperpolymere nach Injektion oder Infusion das Volumen des zirkulierenden Blutes nicht bleibend vergrößern (sondern vielmehr das Wasser

und die Salze ihrer Zubereitung möglichst umfänglich über die Nieren wieder ausgeschieden werden), muss die onkotisch wirksame Anzahl an Wirkstoffmolekülen so weit wie möglich verringert werden. Dazu werden die Hämoglobine chemisch (mittels poly- oder bifunktionaler Vernetzer) quer-vernetzt und polymerisiert. So entstehen künstliche, Sauerstoff bindende Riesenmoleküle. Chemisch betrachtet sind molekular vernetzte Hämoglobine Multimere des Monomeren Hämoglobin. Dabei wird jedoch keinerlei Aussage darüber getroffen, welche Multimere – es handelt sich hierbei um eine breite Molekulargewichtsverteilung mit Oligomeren und höheren Polymeren - welche Auswirkungen auf die Eigenschaften des Gesamtproduktes haben.

3. Lungenödeme

Ein Ödem ist eine abnorme Flüssigkeitsansammlung im Interzellularraum (Interstitium). Lungenödeme sind ein häufiges klinisches Krankheitsbild. Sie führen zu einer lebensbedrohlichen Beeinträchtigung der Gesundheit, die in schweren Fällen tödlich verläuft. Man unterscheidet hauptsächlich das durch Insuffizienz des linken Ventrikels bedingte kardiale (Stauungs-) Ödem und die toxisch bedingten Lungenödeme mit Erhöhung der Kapillarpermeabilität bei Lungenentzündungen, Inhalation schädigender Gase, bspw. auch bei hohen Sauerstoff-Konzentrationen, Urämie, oder bei Überempfindlichkeitsreaktionen etc.

Die Therapie ist immer symptomatisch bezüglich der lebensbedrohlichen Beeinträchtigung der Lungenfunktion (Intensivmedizinische Versorgung, Kortikoide zur Unterdrückung entzündlicher Vorgänge, Sauerstoff-angereicherte Atemluft und Überdruckbeatmung, etc.) und wenn möglich kausal bezüglich der Ursachen (Expositionsprophylaxe, Therapie der kardialen Insuffizienz oder der zugrunde liegenden Nierenkrankheit, etc.)

(Zum Stand der Technik siehe bspw.: Böcker, W, Denk, H. Heitz Ph. U (Hrsg.): Pathologie, Urban & Schwarzenberg, München u. a. 1997; Gerock W. Huber CH, Meinertz T, Zeidler H (Hrsg.): Gross ▪ Schölmerich ▪ Gerock - Die Innere Medizin, 10. völlig neu bearb. und erw. Auflage, Schattauer, Stuttgart und New York 2000; Weikrauch T.R.. (Hrsg.): Wolff ▪ Weikrauch - Internistische Therapie

2000/2001, 13. neubearb. Auflage, Urban & Fischer, München und Jena 2000; Arch. Cardiol. Mex., Vol. 72, Seite 280-285).

Aufgabe der Erfindung

- 5 Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine verbesserte symptomatische Therapie des akuten Lungenödems, insbesondere der hohen Letalität dieser Erkrankungen (klinisch werden Sterblichkeiten zwischen 30 und 90 % angegeben), bereit zu stellen.

10 Lösung der Aufgabe

- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch die Herstellung und Anwendung einer hypo- onkotischen Lösung chemisch modifizierter, hoch-molekular vernetzter hyperpolymerer Hämoglobine. Überraschender Weise kann mit solchen Lösungen wirksam ein akutes Lungenödem therapiert und die
- 15 Sterblichkeit verringert werden.

Nähere Beschreibung der Erfindung

- Nach vorliegender Erfindung kann ein akutes Lungenödem wirksam behandelt werden durch die Verabreichung einer wässrigen Lösung in das Blut
- 20 addierbarer hyperpolymerer Hämoglobin-Derivate, deren onkotischer Druck in wässriger Lösung viel geringer ist als der des vorhandenen Blutes, und somit als Additiv einen hypo-onkotischen Druck zeigt.

Beschreibung der Abbildungen

- 25 Figur 1 zeigt beispielhaft die Abhängigkeit des onkotischen Druckes (π_{onk}) einer Lösung eines erfindungsgemäß zur verbesserten Therapie eines akuten Lungenödems verwendeten chemisch modifizierten, hoch-molekular vernetzten Hämoglobins .
- Figur 2 zeigt die Wirksamkeit chemisch modifizierten, hoch-molekular vernetzten Hämoglobins zur verbesserten Therapie eines akuten Lungenödems,
- 30 hier als die Überlebenszeit von zehn narkotisierten Ratten nach Beibringung

eines letalen toxischen Lungenödems (durch Injektion von Ölsäure), von denen fünf Tiere zur Therapie den Wirkstoff in ihr Blut addiert bekamen.

Besondere Ausführungsform der Erfindung

5 Gemäß der Erfindung werden Mittel bereitgestellt und verwendet, nämlich wässrige Lösungen, enthaltend die genannten hyperpolymeren Hämoglobine. Insbesondere sind die wässrigen Lösungen Elektrolyt-haltige Lösungen. Vor allem entsprechen diese dem physiologischen Milieu. Die erfindungsgemäß eingesetzten chemisch modifizierten Sauerstoffträger (hyperpolymere
10 Hämoglobine) stammen vom Menschen, vom Schwein oder vom Rind. Bevorzugt stammen sie vom Schwein.

Die erfindungsgemäß verwendeten hyperpolymeren Hämoglobine sind hoch molekulare, intermolekular vernetzte Hämoglobine. Die intermolekulare Vernetzung von Hämoglobinen ist allgemein bekannt und z. B. beschrieben in
15 DE 197 01 37, EP 97 100790, DE 44 18 937, DE 38 41 105, DE 37 14 351, DE 35 76 651. Diese bekannten Verfahren sind daher hier inkorporiert.

Die Hämoglobin-Hyperpolymeren können, außer einer intermolekularen Vernetzung (Polymerisation), vielfältig weiter chemisch modifiziert sein. Beispielsweise können zur Modifikation der Affinität und Kooperativität der
20 Ligandenbindung chemisch reaktive Effektoren kovalent angeknüpft sein. Für verschiedene gewünschte funktionelle Verbesserungen der Hämoglobin-Hyperpolymere, wie bspw. eine Verminderung ihrer Immunogenität oder eine Verlängerung der Verweildauer im Gefäßsystem (Katren, V.: „The Conjugation of Proteins With Polyethylene Glycol and Other Polymers – Altering Properties
25 of Proteins to Enhance Their Therapeutic Potential“, Advanced Drug Delivery Reviews 10 (1993): 91 - 114), oder eine Verbesserung der Verträglichkeit mit Proteinen des ‚Empfänger‘-Blutplasmas (DE 100 31 744 A 1) können weitere Makromoleküle (wie bspw. Polyethylenoxide, Polyethylenglykole, Dextrane, Hydroxyethylstärken, etc.) unterschiedlicher Kettenlängen (Molmassen)
30 kovalent angeknüpft sein.

In einer bevorzugten Ausführungsform ist an die modifizierten hyperpolymeren Hämoglobine ein Makromolekül, insbesondere ein Polyalkylenoxid, kovalent gebunden.

Eine besonders bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung verwendet
5 Hämoglobin-Hyperpolymere, die gemäß den deutschen Patentanmeldungen DE (OS) 100 31 740, DE (OS) 100 31 742 und DE (OS) 100 31 744 A1 hergestellt werden, deren Inhalt hier inkorporiert ist. Es handelt hierbei um polymerisierte Produkte (intermolekulare Vernetzung), wobei weiterhin noch eine Pegylierung (kovalente Verknüpfung mit Polyalkylenoxiden) vorgenommen ist.

10 In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform kann gewünschtenfalls zusätzlich hierzu noch eine Umsetzung mit chemisch reaktiven Effektoren wie Pyridoxal-5'-Phosphat oder 2-Nor-2-Formyl-Pyridoxal-5'-Phosphat (intramolekulare Vernetzung), oder die Reaktion kann auch in Anwesenheit von chemisch nicht reaktiven Effektoren der Sauerstoffbindung wie z. B. 2,3-
15 Bisphosphoglycerat, Inositolhexaphosphat, Inositolhexasulfat oder Mellitsäure stattfinden oder es kann eine Kombination dieser Umsetzung bzw. Milieubedingung vorgenommen sein. Derartige Produkte sind bekannt und wie oben erläutert beschrieben.

Bevorzugt sind solche Sauerstoffträger, die polymerisiert sind zum Beispiel mit
20 für die intermolekulare Umsetzung bekannten bifunktionellen Vernetzer wie Butadiendiepoxid, Divinylsulfon, Diisocyanat, insbesondere Hexamethylen-diisocyanat, Zykhlohexyldiisocyanat und 2,5-Bisisocyanatobenzolsulfonsäure, Di-N-Hydroxysuccinimidylester, Diimidoester, oder Dialdehyd, insbesondere Glyoxal, der analog reagierende Glykolaldehyd, oder Glutardialdehyd. Diese
25 Produkte werden dann insbesondere mit einem Polyethylenglykol oder anderen geeigneten Makromolekülen verknüpft. Hierzu gehören beispielsweise Polyethylenoxid, Polypropylenoxid, oder ein Copolymer aus Ethylenoxid und Propylenoxid oder ein Ester, Ether oder Esteramid hiervon. Es ist ferner bevorzugt, wenn das kovalent angeknüpfte Polyalkylenoxid eine Molare Masse
30 von 200 bis 5000 g/mol aufweist.

Die Herstellung solchermaßen modifizierter Sauerstoffbinder ist in den oben genannten deutschen Patentanmeldungen beschrieben und hierin inkorporiert.

Ganz besonders bevorzugt sind Hyperpolymere, die aus desoxygeniertem Schweinehämoglobin, mit Glutardialdehyd als bifunktionellem Vernetzer und Polyethylenglykol als kovalent gebundenem Makromolekül zur Oberflächenmodifikation hergestellt sind, siehe DE 100 41 740 A1 oder DE 100 41 744 A1.

- 5 Erfindungsgemäß hat sich gezeigt, dass Hämoglobin-Hyperpolymere mit einem (mittleren) Polymerisationsgrad, der hinreichend groß ist, dass sie als künstliche Sauerstoffträger als ein therapeutisches Blut-Additiv (also ohne das Blutvolumen mehr als gering zu vergrößern, s. o.) in das Blut hinein-gebracht werden können, geeignet sind, wenn sie in einer wässrigen Elektrolytlösung nur
- 10 einen gewissen, niedrigen onkotischen Druck erzeugen. Dieser steht in Beziehung mit dem geeigneten Mittelwert des Polymerisationsgrades (oder der proportionalen Molmasse) des modifizierten polymeren Hämoglobins. Hierbei handelt es sich um das Zahlenmittel, weil die Anzahl der wirksamen Moleküle für den onkotischen Druck verantwortlich ist.
- 15 Insbesondere hat sich gezeigt, dass die genannten Hyperpolymeren dann geeignet sind, wenn ein Polymerisationsgrad vorhanden ist, der hinreichend groß ist, dass der onkotische Druck von Lösungen mit den therapeutischen Konzentrationen der chemisch modifizierten, hochmolekular vernetzten Hämoglobine in einem wässrigen Elektrolyt-haltigen Milieu, (ohne sonstige
- 20 Makromoleküle) weniger als 5 mbar beträgt. Dies sind etwa 1/7 (und somit weniger als 15 %) des onkotischen Druckes menschlichen Blutplasmas von etwa 35 mbar (Applikationen der Mengen der Hämoglobin-Hyperpolymere, die im Blutplasma die genannten therapeutischen Konzentrationen ergeben, führen also zu Zunahmen des Blutplasmavolumens von maximal etwa 15 %).
- 25 Für ideale Lösungen kann der onkotische Druck (π_{onk}) aus der Molaren Masse (M) und dem Gehalt (als Massenkonzentration c_m) des gelösten Kolloids, sowie der allgemeinen Gaskonstanten (R) und der absoluten Temperatur (T) errechnet werden gemäß

30
$$\pi_{\text{onk}} = c_m \cdot R \cdot T \cdot M^{-1} .$$

Für einen wie beschrieben festgelegten oberen Grenzwert des onkotischen Druckes (π_{onk}) von 5 mbar für ein Blut-Additiv errechnet sich aus einer gewünschten therapeutischen Konzentration (c_m) im Blutplasma nach dieser Formel eine minimale Molmasse (als Zahlenmittel) der Hämoglobin-Hyperpolymere von $M = (4.910 \text{ L/mol}) \cdot c_m$, für 2 mbar von $M = (12.300 \text{ L/mol}) \cdot c_m$.

Reale Lösungen zeigen aber eine mit der Konzentration des Kolloids zunehmende Abweichung der onkotischen Drücke zu größeren Werten. Die genannte Formel für ideale Lösungen kann also bestenfalls zur Abschätzung der minimalen Molmassen dienen, für real existierende Polymere muss der reale onkotische Druck experimentell ermittelt werden, zumal er in nicht vorhersagbarer Weise vom strukturellen Aufbau der Polymeren abhängt. Beispielsweise errechnet man (die folgenden Werte sind der experimentell ermittelten Kurve des onkotischen Druckes über der Massenkonzentration, gezeigt als Figur 1, entnommen) für die in den Beispielen verwendete Charge MR A-A aus einer Konzentration von 20 g/L und einem onkotischen Druck von etwa 1 mbar eine zugehörige (ideale) Molmasse von 491.000 g/mol, während die experimentell ermittelte reale Molmasse nur 320.000 g/mol beträgt.

Ganz besonders bevorzugt sind modifizierte Hämoglobine der beschriebenen Art, deren wässrige Elektrolyt-Lösungen einen onkotischen Druck von weniger als 2 mbar, zeigen.

Als wässrige Elektrolytlösungen für die erfindungsgemäße Anwendung der Hämoglobin-Hyperpolymeren sind sämtliche Lösungen mit Zusammensetzungen an Salzen geeignet, die das Extrazellulärmilieu des Menschen (einschließlich des physiologischen pH-Wertes meist um 7,4 (zwischen 7,1 und 7,6)) imitieren oder diesem ähneln, somit insbesondere auch alle Vollelektrolyt-Infusionslösungen zur Elektrolytzufuhr und Kreislaufunterstützung (Übersicht in: Rote Liste Service GmbH (Hrsg.): Rote Liste 2002 – Arzneimittelverzeichnis für Deutschland (einschließlich EU-Zulassungen und bestimmter Medizinprodukte), ECV, Aulendorf 2002 (Kapitel 52, „52. Infusions- und Standard-Injektionslösungen, Organperfusionslösungen“). Diese sind bekannt.

Insbesondere bevorzugt sind wässrige Elektrolytlösungen, enthaltend Wasser und Kochsalz in einer Konzentration zwischen 50 und 150 g/L, vor allem 70 bis 100 g/L.

5 Anwendung

- Somit ist es überraschender Weise möglich, die Schwere eines akuten Lungenödems klinisch zu bessern, und zwar vor allem durch intravasal verabreichte chemisch modifizierte, hoch-molekular vernetzte hyperpolymere Hämoglobine als ein Blut-Additiv, fast ohne das Blutvolumen des Patienten zu vergrößern. Dabei war nicht zu erwarten, dass derartige Sauerstoffträger, wenn sie die beschriebenen Eigenschaften aufweisen, als Additiv so eingesetzt werden können, da diese chemisch modifizierten, hoch-molekular vernetzten Hämoglobine eigentlich als künstliche Sauerstoffträger entwickelt wurden und werden mit der Zielsetzung, periphere Gewebe mit Sauerstoff zu versorgen.
- 15 Völlig überraschend war daher ihre Wirksamkeit zur Verbesserung der Therapie akuter Lungenödeme. Die (prä-)klinische Verbesserung zeigte sich in einem verbesserten Überleben, also einer verringerten Mortalität, in einem Tiermodell (der narkotisierten Ratte) experimenteller toxischer Lungenödeme, von denen nachfolgend Beispiele angeführt werden.
- 20 Die Verabreichung des Sauerstoffträgers erfolgt derart, dass die therapeutischen Konzentrationen im Blutplasma aus Gründen der zunehmenden Viskosität des Blutplasmas nicht wesentlich größer sind als 50 g/L, z. B. 50 bis 60 g/L, und insbesondere zwischen 10 und 40 g/L liegen. Andererseits können auch schon sehr geringe Konzentrationen (Bspw. ab 1 g/L) für eine Therapie
- 25 ausreichend sein.
- Der Sauerstoffträger kann in Konzentrationen von 20 bis 200 g /L, insbesondere 50 bis 100 g /L in der wässrigen Lösung vorliegen.
- Das Mittel kann je nach Bedarf als einmalige Gabe oder auch als periodische oder unregelmäßige wiederholte Gabe verabreicht werden, wobei sich die Art
- 30 und Menge nach dem Zustand, dem Alter, dem Geschlecht und der Gesamtverfassung des Patienten ergeben kann.

Die Therapie eines akuten Lungenödems gemäß der Erfindung erfolgt insofern symptomatisch und effektorientiert. Die Häufigkeit der Gabe der chemisch modifizierten, hoch-molekular vernetzten Hämoglobine beträgt wie erläutert zwischen einmal und einem beliebigen erfolgsabhängigen Höchstwert. Eine Mehrfachgabe kann dabei planmäßig oder bedarfsgesteuert, regelmäßig oder unregelmäßig erfolgen. Die Einzeldosis richtet sich nach der gewünschten therapeutischen Konzentration im Blutplasma und beachtet bereits (oder noch) vorhandene Hämoglobin-Hyperpolymere in diesem Körperkompartiment, dergestalt, dass ein aus anderen Gründen, insbesondere der Erhöhung der Viskosität des Blutplasmas, bereits wieder unerwünschter Höchstwert der Konzentration der Hämoglobin-Hyperpolymeren im Blutplasma von etwa 50 bis 60 g/L nur unter Beachtung des Ergebnisses einer besonders sorgfältigen und kritischen Nutzen-Risiko-Abwägung für den Patienten überschritten wird. Die nach Applikation erreichbare initiale therapeutische Konzentration im Blutplasma ($c_m\text{Hb(PL)}$) kann aus der verabreichten Dosis der Hämoglobin-Hyperpolymere ($m\text{Hb}$) und dem Volumenanteil der Erythrozyten im Blut (dem Hämatokrit: Hkt) und dem Körpergewicht des Patienten (KG) abgeschätzt werden gemäß

$$c_m\text{Hb(PL)} = m\text{Hb} \cdot (BV \cdot \text{KG} \cdot (1 - \text{Hkt}))^{-1}$$

wobei als mittlerer Wert für das Blutvolumen (BV) für Frauen 60,5 mL / kg (KG) (57 ... 64 mL / kg (KG)) und für Männer 69,5 mL / kg (KG) (69 ... 70 mL / kg (KG)) einzusetzen sind.

Herstellung des erfindungsgemäß zu verwendenden Mittels

Das verwendete Mittel wird hergestellt durch einfaches Einbringen des oder der geeigneten Hämoglobin-Hyperpolymeren in wässrige, insbesondere wässrige (sterile) Elektrolytlösungen, welche den oder die Elektrolyten in der genannten Menge enthalten. Die Hyperpolymeren liegen molekular-dispers vor und können sofort, insbesondere als Injektionen wie beschrieben verabreicht werden.

Beispiele

Die Erfindung wird anhand der folgenden Beispiele näher erläutert. Dabei zeigen die Figuren 1 - 2 folgendes:

- Figur 1 zeigt beispielhaft die Abhängigkeit des onkotischen Druckes (π_{onk}) einer Lösung eines erfindungsgemäß zur verbesserten Therapie eines akuten Lungenödems verwendeten chemisch modifizierten, hoch-molekular vernetzten Hämoglobins (ein HP₃Hb (pegylierte Schweinehämoglobin-Hyperpolymere), Charge MR A-A) über dessen Massenkonzentration (c_{mHb}) in einer wässrigen Kochsalzlösung der Konzentration 80 g/L.
- Figur 2 zeigt die Wirksamkeit chemisch modifizierten, hoch-molekular vernetzten Hämoglobins (beispielhaft gezeigt für ein HP₃Hb, Charge MR A-A) zur verbesserten Therapie eines akuten Lungenödems, hier als die Überlebenszeit von zehn narkotisierten Ratten nach Beibringung eines letalen toxischen Lungenödems (durch Injektion von Ölsäure), von denen fünf Tiere zur Therapie den Wirkstoff in ihr Blut addiert bekamen.

Folgende Materialien kamen zum Einsatz:

1. Das chemisch modifizierte, hoch-molekular vernetzte Hämoglobin war ein pegyliertes Schweinehämoglobin-Hyperpolymere (ein HP₃Hb, Charge MR A-A), das prinzipiell entsprechend der DE (OS) 100 31 740 A 1 aseptisch (im Labormaßstab) hergestellt wurde. Speziell wurde die Charge MR A-A aus einer Mischung der Syntheseprodukte-Chargen MR 14, MR 15 und MR 16 durch präparative Ultrafiltration gewonnen.

- MR 14: Steriles, hochreines Schweinehämoglobin, in einer Konzentration von 289 g/L gelöst in einem wässrigen Elektrolyten der Zusammensetzung 20 mM NaHCO₃ und 150 mM NaCl, wurde bei 4 °C durch Rühren der Lösung unter ständig erneuertem, reinen Stickstoff desoxygeniert, 4 mol Natrium-Ascorbat (als 1-molare Lösung in Wasser) je Mol Hämoglobin zugegeben und etwa 15 Stunden reagieren lassen, die Lösung mit 2-molarer Milchsäure auf einen pH-Wert von 5,7 titriert, 2 Mol Inositolhexaphosphat (als 0,25-molare Lösung in Wasser) pro mol Hämoglobin zugegeben, nach etwa 1 Stunde mit 2-molarer Milchsäure auf einen pH-Wert von 6,5 titriert, 9,9 Mol Glutardialdehyd (als etwa

1,9-%-ige Lösung in deoxygeniertem Wasser) je Mol Hämoglobin zur Vernetzung des Hämoglobins innerhalb 1,5 Stunden zugegeben, 1,8 L Wasser, das mit Stickstoff äquilibriert war, je Liter initiale Hämoglobinlösung zugegeben, nach 20 Stunden mit 0,5-molarer Natronlauge auf einen pH-Wert von 6,9 titriert, 20 Mol Natriumborhydrid (als 1-molare Lösung in 0,01-molarer Natronlauge) je Mol Hämoglobin zugegeben und für 15 Minuten reagieren lassen, 4 Mol Methoxy-Succinimidylpropionat-Polyethylenglykol des Molekulargewichts 1000 g/mol (als etwa 25-%-ige Lösung in Wasser) zugegeben und für 1 Stunde reagieren lassen, und schließlich die Stickstoffatmosphäre durch reinen Sauerstoff ersetzt und eine Stunde lang äquilibrieren lassen. Ungelöste Bestandteile wurden durch Zentrifugation (10 min mit 20.000 g) abgetrennt und die überstehende Lösung zur weiteren Klärung durch Filter abnehmender Porenweite, zuletzt von 0,2 µm, filtriert.

MR 15: Steriles, hochreines Schweinehämoglobin, in einer Konzentration von 281 g/L gelöst in einem wässrigen Elektrolyten der Zusammensetzung 20 mM NaHCO₃ und 150 mM NaCl, wurde bei 4 °C durch Rühren der Lösung unter ständig erneuertem, reinen Stickstoff desoxygeniert, 4 mol Natrium-Ascorbat (als 1-molare Lösung in Wasser) je Mol Hämoglobin zugegeben und etwa 3 Stunden reagieren lassen, die Lösung mit 2-molarer Milchsäure auf einen pH-Wert von 5,7 titriert, 2 Mol Inositolhexaphosphat (als 0,25-molare Lösung in Wasser) pro mol Hämoglobin zugegeben, nach etwa 1 Stunde mit 2-molarer Milchsäure auf einen pH-Wert von 6,3 titriert, 9,9 Mol Glutardialdehyd (als etwa 1,9-%-ige Lösung in deoxygeniertem Wasser) je Mol Hämoglobin zur Vernetzung des Hämoglobins innerhalb 1,5 Stunden zugegeben, 1,8 Liter Wasser, das mit Stickstoff äquilibriert war, je Liter initiale Hämoglobinlösung zugegeben, nach 17 Stunden mit 0,5-molarer Natronlauge auf einen pH-Wert von 6,9 titriert, 20 Mol Natriumborhydrid (als 1-molare Lösung in 0,01-molarer Natronlauge) je Mol Hämoglobin zugegeben und für 15 Minuten reagieren lassen, 4 Mol Methoxy-Succinimidylpropionat-Polyethylenglykol des Molekulargewichts 1000 g/mol (als etwa 25-%-ige Lösung in Wasser) zugegeben und für 1 Stunde reagieren lassen, und schließlich die Stickstoffatmosphäre durch reinen Sauerstoff ersetzt und eine Stunde lang äquilibrieren lassen. Ungelöste Bestandteile wurden durch

Zentrifugation (10 min mit 20.000 g) abgetrennt und die überstehende Lösung zur weiteren Klärung durch Filter abnehmender Porenweite, zuletzt von 0,2 µm, filtriert.

MR 16: Steriles, hochreines Schweinehämoglobin, in einer Konzentration von 262 g/L gelöst in einem wässrigen Elektrolyten der Zusammensetzung 20 mM NaHCO₃ und 150 mM NaCl, wurde bei 4 °C durch Rühren der Lösung unter ständig erneuertem, reinen Stickstoff desoxygeniert, 4 mol Natrium-Ascorbat (als 1-molare Lösung in Wasser) je Mol Hämoglobin zugegeben und etwa 27 Stunden reagieren lassen, die Lösung mit 2-molarer Milchsäure auf einen pH-Wert von 5,8 titriert, 2 Mol Inositolhexaphosphat (als 0,25-molare Lösung in Wasser) pro mol Hämoglobin zugegeben, nach etwa 1,5 Stunde mit 2-molarer Milchsäure auf einen pH-Wert von 6,5 titriert, 9,9 Mol Glutardialdehyd (als etwa 1,9-%-ige Lösung in deoxygeniertem Wasser) je Mol Hämoglobin zur Vernetzung des Hämoglobins innerhalb 1,5 Stunden zugegeben, 1,8 Liter Wasser, das mit Stickstoff äquilibriert war, je Liter initiale Hämoglobinlösung zugegeben, nach 17 Stunden mit 0,5-molarer Natronlauge auf einen pH-Wert von 6,9 titriert, 20 Mol Natriumborhydrid (als 1-molare Lösung in 0,01-molarer Natronlauge) je Mol Hämoglobin zugegeben und für 1,5 Stunden reagieren lassen, 4 Mol Methoxy-Succinimidylpropionat-Polyethylenglykol des Molekulargewichts 1000 g/mol (als etwa 25-%-ige Lösung in Wasser) zugegeben und für 1 Stunde reagieren lassen, und schließlich die Stickstoffatmosphäre durch reinen Sauerstoff ersetzt und eine Stunde lang äquilibrieren lassen. Ungelöste Bestandteile wurden durch Zentrifugation (10 min mit 20.000 g) abgetrennt und die überstehende Lösung zur weiteren Klärung durch Filter abnehmender Porenweite, zuletzt von 0,2 µm, filtriert.

MR A-A: 3720 mL MR 14 mit 107 g Hämoglobin-Polymeren, 3600 mL MR 15 mit 115 g Hämoglobin-Polymeren und 3900 mL MR 16 mit 127 g Hämoglobin-Polymeren wurden gemischt und in mehreren Anteilen in einer Ultrafiltrationsanlage (Centramate von Pall-Filtron) bei einer mittleren Konzentration von 40 g/L über und durch Celluloseacetatmembranen der Nominellen Molmassen-Trenngrenze 1 MDa fraktioniert, wobei der Filtratfluss durch ein Ventil auf Werte unter 50 % des Maximums (der so genannter Wasserfluss) eingestellt war und

jeweils mindestens das zehnfache Volumen der Vorlage an Diafiltrationslösung (diese enthielt Kochsalz in einer Konzentration von 80 g/L) in einem kontinuierlichen Diafiltrationsmodus zum gleichzeitigen Lösungsmitteltausch verwendet wurden. Zum Abschluss wurden die Retentate konzentriert und später vereinigt.

Diese präparativ abgetrennte Fraktion des Wirkstoffes besaß eine Molmassenverteilung mit einem Zahlenmittel der Molmassen von 230.000 g/mol und einem Massenmittel von 993.000 g/mol. Der so erhaltene Wirkstoff kam in einer sterilen und gemäß Ph. Eur. hinreichend endotoxinarmen wässrigen Lösung von 80 g/L NaCl in WFI (Wasser für Injektionszwecke) zum Einsatz. Sein Massengehalt betrug 58 g/L, der pH-Wert der Zubereitung 7,3.

2. Die Versuchstiere waren weiße Laborratten mit einem mittleren Körpergewicht von etwa 350 g (die Spannweite der Körpergewichte aller verwendeten zehn Tiere betrug zwischen 315 und 390 g), die gemäß gültiger Tierschutzregeln gezüchtet und gehalten waren. Sie hatten bis zum Vortag des jeweiligen Experiments freien Zugang zu hinreichender Nahrung, trinken konnten sie bis unmittelbar vor Versuchsbeginn.

Folgende speziellen Bestimmungsmethoden wurden angewendet:

1. Hämoglobingehalte wurden fotometrisch mit der modifizierten Cyanhämoglobin-Methode nach Drabkin („Hämoglobin-Farbstest MRP3“, Boehringer Mannheim, D), pH-Werte potentiometrisch (pH-Glaselektrode) mit einem Blutgasanalysator („ABL 5“, Radiometer, Willich, D) gemessen.

2. Bestimmungen der Molekulargewichts-Verteilungen der vernetzten Hämoglobine, sowie charakteristischer Kennwerte dieser erfolgten durch Volumenausschluss-Chromatografie (gemäß Pötzschke H. et al. (1997): „Molar Masses and Structure in Solution of Haemoglobin Hyperpolymers – A Common Calibration of Size Exclusion Chromatography of These Artificial Oxygen Carriers“, Artificial Cells, Blood Substitutes, and Immobilization Biotechnology 25, 527 - 540) am Gel Sephacryl S-400 HR (Pharmacia Biotech, Freiburg, D).

3. Bestimmungen der onkotischen Drücke wässriger Lösungen der vernetzten Hämoglobine erfolgten mit Membranosmometern (Membrane-Osmometer oder

Colloid-Osmometer, Knauer, Berlin, D), einer wässrigen Kochsalz-Lösung (80 g/L NaCl und 0,2 g/L NaN_3) als Lösungsmittel und Celluloseacetat-Membranen der Nominellen Molmassen-Trenngrenze 20.000 Da.

5 Ausführungsbeispiel 1: Vergleichsgruppe

Fünf Laborratten bekamen eine systemische Vollnarkose durch intraperitoneale Injektion von 50 mg Pentobarbital je kg Körpergewicht. Die Narkosetiefe wurde über die Zeit konstant im (chirurgischen) Toleranzstadium (dem 3. klassischen Narkosestadium nach A. Guedel) gehalten, indem jeweils nach Auftreten einer aktiven Schmerzreaktion (Zurückziehen) auf ein periodisches Kneifen einer Pfote erneut 17 mg Pentobarbital je kg Körpergewicht als Erhaltungsdosis verabreicht wurden (in etwa alle 90 min). Die Tiere erhielten einen venösen Katheter aus PE-Schlauch in eine Vena jugularis implantiert, und im weiteren Verlauf der Versuche je Stunde etwa 0,5 mL einer isotonen Kochsalzlösung (90 g NaCl je L Lösung) zur Aufrechterhaltung einer ausgeglichenen Flüssigkeitsbilanz über diesen Katheter intravenös verabreicht.

Den Tieren wurde, zur Erzeugung eines akuten toxischen Lungenödems, genau 48 μL Ölsäure je kg Körpergewicht über drei Minuten gleichmäßig intravenös verabreicht.

Abbildung 2 zeigt im linkem Teil die Überlebenszeiten der fünf Tiere, die alle in weniger als vier Stunden verstarben, vier von ihnen sogar in weniger als drei Stunden (gerechnet ab der Injektion der Ölsäure)

25 Ausführungsbeispiel 2: Therapiegruppe

Fünf weitere Ratten wurden ansonsten ganz analog wie im Ausführungsbeispiel 1 beschrieben behandelt, mit dem einzigen Unterschied, dass ihnen 15 und 45 min nach der intravenösen Gabe der Ölsäure jeweils 2,5 mL der Zubereitung des chemisch modifizierten, hoch-molekular vernetzten Hämoglobins (ein HP₃Hb, ein pegyliertes Schweinehämoglobin-Hyperpolymere - Charge MR A-A) intravenös verabreicht wurde. Der mittlere Hämoglobingehalt im Blutplasma

nach der zweiten Gabe betrug etwa 23 g/L, der anschließend langsam (mit einer Plasmahalbwertszeit von etwa 18 Stunden) reduziert wurde.

Abbildung 2 zeigt im rechten Teil die Überlebenszeiten dieser fünf Tiere, die ausnahmslos länger als sieben Stunden überlebten und schließlich, um die Ver-

5 suche zu beenden, in Narkose getötet wurden.

Der Vergleich der Überlebenszeiten der Tiere in beiden Experimentalgruppen zeigt die enorme Wirksamkeit der Hämoglobin-Hyperpolymeren zur Verminderung der spontanen Letalität hier experimentell induzierter toxischer Lungenödeme.

10

Patentansprüche

5

1. Verwendung wässriger hypo-onkotischer Lösungen, enthaltend Elektrolyte und chemisch modifizierte, hoch-molekular vernetzte hyperpolymere Hämoglobine, zur Herstellung eines Mittels zur Behandlung akuter Lungenödeme.

10

2. Verwendung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die chemisch modifizierten hyperpolymeren Hämoglobine vom Menschen, vom Schwein oder vom Rind stammen.

15

3. Verwendung gemäß einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der onkotische Druck in den wässrigen Elektrolytlösungen weniger als 5 mbar beträgt.

20

4. Verwendung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass Kochsalz in einer Konzentration zwischen 50 und 150 g/L enthalten ist.

5. Verwendung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass Elektrolyte, entsprechend den physiologischem Milieu enthalten sind.

25


6. Verwendung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass an die modifizierten hyperpolymeren Hämoglobine ein Polyalkylenoxid, kovalent gebunden ist.

30


7. Verwendung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel in Form der wässrigen Lösung als Injektion intravasal verabreicht wird.

8. Verwendung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel in Form der wässrigen Lösung ein oder mehrmals verabreicht wird.

1 / 2

**Figur 1**

2 / 2

**Figur 2**

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.
PCT/EP2004/012363

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 A61K38/42 A61P7/10 A61P11/00		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 A61K A61P		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, PAJ, EMBASE, BIOSIS, CHEM ABS Data		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	BARNIKOL ET AL: "Hyperpolymere Hämoglobine als künstliche Sauerstoffträger" THERAPIEWOCHE, vol. 15, 1996, pages 811-815, XP009044173 cited in the application the whole document <div style="text-align: center;">----- -/--</div>	1-8
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of box C. <input checked="" type="checkbox"/> Patent family members are listed in annex </div>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>* Special categories of cited documents</p> <p>*A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</p> <p>*E* earlier document but published on or after the international filing date</p> <p>*L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</p> <p>*O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</p> <p>*P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p>*T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</p> <p>*X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</p> <p>*Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.</p> <p>*Z* document member of the same patent family</p> </div> </div>		
Date of the actual completion of the international search <div style="text-align: center;">21 February 2005</div>		Date of mailing of the international search report <div style="text-align: center;">03/03/2005</div>
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P. B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel (+31-70) 340-2040, Tx 31 651 epo nl, Fax (+31-70) 340-3016		Authorized officer <div style="text-align: center;">Pacreu Largo, M</div>

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2004/012363

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	<p>BARNIKOL WOLFGANG K R ET AL: "New artificial oxygen carriers made of pegulated polymerised pyridoxylated porcine haemoglobin (P4Hb)" COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY PART A MOLECULAR AND INTEGRATIVE PHYSIOLOGY, vol. 132A, no. 1, May 2002 (2002-05), . pages 185-191, XP002318526 ISSN: 1095-6433 page 185 - page 186, right-hand column page 188, right-hand column, last paragraph - page 189, left-hand column, paragraph 1</p>	1-8
A	<p>WO 02/00230 A (SANGUIBIOTECH AG; BARNIKOL, WOLFGANG; BURKHARD, OSWALD; POETZSCHKE, HA) 3 January 2002 (2002-01-03) cited in the application page 13; claims & DE 100 31 740 A1 (SANGUIBIO TECH AG) 14 February 2002 (2002-02-14)</p>	1-8
A	<p>WO 02/00768 A (SANGUIBIO TECH AG; BARNIKOL, WOLFGANG) 3 January 2002 (2002-01-03) cited in the application claims & DE 100 31 744 A1 (SANGUIBIO TECH AG) 17 January 2002 (2002-01-17)</p>	1,6
A	<p>VANDEGRIFF K D: "HAEMOGLOBIN-BASED OXYGEN CARRIERS" EXPERT OPINION ON INVESTIGATIONAL DRUGS, ASHLEY PUBLICATIONS LTD., LONDON, GB, vol. 9, no. 9, 2000, pages 1967-1984, XP008034792 ISSN: 1354-3784 cited in the application abstract</p>	1
P,X	<p>WO 03/094953 A (SANGUIBIOTECH AG; BARNIKOL, WOLFGANG; POETZSCHKE, HARALD) 20 November 2003 (2003-11-20) page 10, line 16 - page 14, line 21; claims; examples 1-6</p>	1-8
P,X	<p>BARNIKOL W K R ET AL: "Haemoglobin hyperpolymers, a new type of artificial oxygen carrier - Concept and current state of development" TRANSFUSION MEDICINE AND HEMOTHERAPY, vol. 31, no. 4, August 2004 (2004-08), pages 269-281, XP009044191 ISSN: 1660-3796 the whole document</p>	1-8

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No
PCT/EP2004/012363

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 0200230	A	03-01-2002	DE 10031740 A1	14-02-2002
			AU 8385701 A	08-01-2002
			WO 0200230 A1	03-01-2002
			EP 1294386 A1	26-03-2003
			US 2004029780 A1	12-02-2004
DE 10031740	A1	14-02-2002	AU 8385701 A	08-01-2002
			WO 0200230 A1	03-01-2002
			EP 1294386 A1	26-03-2003
			US 2004029780 A1	12-02-2004
WO 0200768	A	03-01-2002	DE 10031744 A1	17-01-2002
			AU 6751501 A	08-01-2002
			WO 0200768 A1	03-01-2002
			EP 1299457 A1	09-04-2003
			US 2004014641 A1	22-01-2004
DE 10031744	A1	17-01-2002	AU 6751501 A	08-01-2002
			WO 0200768 A1	03-01-2002
			EP 1299457 A1	09-04-2003
			US 2004014641 A1	22-01-2004
WO 03094953	A	20-11-2003	DE 10220992 A1	04-12-2003
			WO 03094953 A1	20-11-2003

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/012363

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 A61K38/42 A61P7/10 A61P11/00		
Nach der internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK		
B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 A61K A61P		
Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data, PAJ, EMBASE, BIOSIS, CHEM ABS Data		
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	BARNIKOL ET AL: "Hyperpolymere Hämoglobine als künstliche Sauerstoffträger" THERAPIEWOCHEN, Bd. 15, 1996, Seiten 811-815, XP009044173 in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument ----- -/--	1-8
<input checked="" type="checkbox"/> Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen		
<input checked="" type="checkbox"/> Siehe Anhang Patentfamilie		
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "Z" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 21. Februar 2005		Absenddatum des internationalen Recherchenberichts 03/03/2005
Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter Pacreu Largo, M

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

nationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/012363

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	<p>BARNIKOL WOLFGANG K R ET AL: "New artificial oxygen carriers made of pegulated polymerised pyridoxylated porcine haemoglobin (P4Hb)" COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY PART A MOLECULAR AND INTEGRATIVE PHYSIOLOGY, Bd. 132A, Nr. 1, Mai 2002 (2002-05), Seiten 185-191, XP002318526 ISSN: 1095-6433 Seite 185 - Seite 186, rechte Spalte Seite 188, rechte Spalte, letzter Absatz - Seite 189, linke Spalte, Absatz 1</p>	1-8
A	<p>WO 02/00230 A (SANGUIBIOTECH AG; BARNIKOL, WOLFGANG; BURKHARD, OSWALD; POETZSCHKE, HA) 3. Januar 2002 (2002-01-03) in der Anmeldung erwähnt Seite 13; Ansprüche & DE 100 31 740 A1 (SANGUIBIO TECH AG) 14. Februar 2002 (2002-02-14)</p>	1-8
A	<p>WO 02/00768 A (SANGUIBIO TECH AG; BARNIKOL, WOLFGANG) 3. Januar 2002 (2002-01-03) in der Anmeldung erwähnt Ansprüche & DE 100 31 744 A1 (SANGUIBIO TECH AG) 17. Januar 2002 (2002-01-17)</p>	1,6
A	<p>VANDEGRIFF K D: "HAEMOGLOBIN-BASED OXYGEN CARRIERS" EXPERT OPINION ON INVESTIGATIONAL DRUGS, ASHLEY PUBLICATIONS LTD., LONDON, GB, Bd. 9, Nr. 9, 2000, Seiten 1967-1984, XP008034792 ISSN: 1354-3784 in der Anmeldung erwähnt Zusammenfassung</p>	1
P,X	<p>WO 03/094953 A (SANGUIBIOTECH AG; BARNIKOL, WOLFGANG; POETZSCHKE, HARALD) 20. November 2003 (2003-11-20) Seite 10, Zeile 16 - Seite 14, Zeile 21; Ansprüche; Beispiele 1-6</p>	1-8
P,X	<p>BARNIKOL W K R ET AL: "Haemoglobin hyperpolymers, a new type of artificial oxygen carrier - Concept and current state of development" TRANSFUSION MEDICINE AND HEMOTHERAPY, Bd. 31, Nr. 4, August 2004 (2004-08), Seiten 269-281, XP009044191 ISSN: 1660-3796 das ganze Dokument</p>	1-8

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/012363

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 0200230 A	03-01-2002	DE 10031740 A1	14-02-2002
		AU 8385701 A	08-01-2002
		WO 0200230 A1	03-01-2002
		EP 1294386 A1	26-03-2003
		US 2004029780 A1	12-02-2004
DE 10031740 A1	14-02-2002	AU 8385701 A	08-01-2002
		WO 0200230 A1	03-01-2002
		EP 1294386 A1	26-03-2003
		US 2004029780 A1	12-02-2004
WO 0200768 A	03-01-2002	DE 10031744 A1	17-01-2002
		AU 6751501 A	08-01-2002
		WO 0200768 A1	03-01-2002
		EP 1299457 A1	09-04-2003
		US 2004014641 A1	22-01-2004
DE 10031744 A1	17-01-2002	AU 6751501 A	08-01-2002
		WO 0200768 A1	03-01-2002
		EP 1299457 A1	09-04-2003
		US 2004014641 A1	22-01-2004
WO 03094953 A	20-11-2003	DE 10220992 A1	04-12-2003
		WO 03094953 A1	20-11-2003